
Lifyorli™
(relacorilant) 100 mg, 25 mg capsules

# Es hora de DEJAR HUELLA



La combinación de LIFYORLI con nab-paclitaxel puede ayudar a las mujeres con cáncer de ovario resistente al platino a vivir más tiempo que si recibieran únicamente quimioterapia. **Porque aún hay momentos para crear.**

La persona que aparece no es una paciente real.

En un estudio clínico de 381 pacientes, quienes recibieron LIFYORLI en combinación con nab-paclitaxel presentaron una reducción del 35% en el riesgo de muerte y un riesgo 30% menor de progresión del cáncer* en comparación con quienes recibieron únicamente nab-paclitaxel.

**¿Qué es LIFYORLI?**
LIFYORLI es un medicamento recetado que se usa con un medicamento de quimioterapia llamado nab-paclitaxel para el tratamiento de adultas con cáncer de ovario, de trompas de Falopio o peritoneal primario que cumplan con los siguientes requisitos:

- no haber respondido o haber dejado de responder a un tratamiento con quimioterapia basada en platino; y
- haber recibido entre 1 y 3 tratamientos sistémicos previos, al menos uno de los cuales incluyó bevacizumab.

Se desconoce la seguridad y eficacia de LIFYORLI en menores de edad.

**Información importante de seguridad**

**¿Quiénes no deben tomar LIFYORLI?**
**No tome LIFYORLI si** está tomando un medicamento esteroideo por vía oral o lo recibe mediante inyección (glucocorticoide sistémico) con fines de salvar la vida. LIFYORLI puede disminuir la eficacia de los glucocorticoides.

* La progresión se definió como el empeoramiento del cáncer, según lo mostrado en estudios por imágenes, o el fallecimiento de la paciente por cualquier causa, lo que ocurriera primero.

**Consulte la información importante de seguridad adicional en la página 15 y los Datos importantes sobre LIFYORLI.**

Lifyorli™
(relacorilant) 100 mg, 25 mg capsules

# Índice


04 Cómo se estudió LIFYORLI

06 Posibles efectos secundarios de LIFYORLI en combinación con nab-paclitaxel

08 Cómo tomar LIFYORLI

10 Cómo funciona LIFYORLI

12 Apoyo mientras recibe LIFYORLI

14 Términos útiles

15 Información importante de seguridad




La persona que aparece no es una paciente real.

# LIFYORLI junto con nab-paclitaxel puede ayudar a las mujeres a vivir más tiempo

Lifyorli™ (relacorilant) 100 mg, 25 mg capsules

LIFYORLI, un medicamento oral, en combinación con nab-paclitaxel (una quimioterapia) puede ser una opción para usted si cumple con los siguientes requisitos:

- Su cáncer de ovario dejó de responder a la quimioterapia basada en platino o ya no puede recibirla.
- Recibió entre 1 y 3 tratamientos sistemicos previos, de los cuales al menos uno es bevacizumab.

Se ha demostrado que esta combinación puede ayudar a algunas mujeres a vivir más tiempo y a tener un menor riesgo de progresión del cáncer*, sin necesidad de realizar pruebas de biomarcadores†.



## Acerca de LIFYORLI

**LIFYORLI actúa disminuyendo los efectos del cortisol en las células cancerosas.** El cortisol es una hormona natural que puede reducir la eficacia de la quimioterapia y suprimir la respuesta inmunitaria del cuerpo. **Al reducir la acción del cortisol, LIFYORLI puede hacer que las células cancerosas sean más sensibles a la quimioterapia y puede activar indirectamente el sistema inmunitario para ayudar a su cuerpo a combatir las células cancerosas.**

En un estudio clínico de 381 pacientes, aquellas que recibieron LIFYORLI en combinación con nab-paclitaxel presentaron una reducción del 35% en el riesgo de muerte y un riesgo 30% menor de progresión del cáncer* en comparación con quienes recibieron únicamente nab-paclitaxel.

*La progresión se definió como el empeoramiento del cáncer, según lo mostrado en estudios por imágenes, o el fallecimiento de la paciente por cualquier causa, lo que ocurriera primero.

†Un gen o una proteína específicos presentes en las células cancerosas.

## Información importante de seguridad (continuación)

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LIFYORLI?

**LIFYORLI puede causar efectos secundarios graves, tales como los siguientes:**

- **Recuento bajo de glóbulos blancos (neutropenia) e infecciones graves.** LIFYORLI combinado con nab-paclitaxel puede disminuir los recuentos de glóbulos blancos, lo que puede producir fiebre e infecciones graves, y causar la muerte. El profesional de la salud controlará sus recuentos de glóbulos antes de cada administración semanal de LIFYORLI combinado con nab-paclitaxel y cuando sea necesario. Informe de inmediato a este profesional si presenta fiebre, escalofríos, debilidad, confusión mental u otros signos o síntomas de una infección.


**Consulte la información importante de seguridad adicional en la página 15 y los Datos importantes sobre LIFYORLI.**

# Cómo se estudió LIFYORLI

Lifyorli™ (relacorilant) 100 mg, 25 mg capsules



**En un estudio clínico global denominado ROSELLA, el cual se diseñó para evaluar el grado de eficacia del tratamiento, se inscribieron 381 pacientes con cáncer de ovario resistente al platino:**

- 188 recibieron LIFYORLI junto con nab-paclitaxel
- 193 recibieron únicamente nab-paclitaxel

## Antes del estudio, las pacientes habían recibido entre uno y tres tratamientos anteriores, que incluían:

- Quimioterapia con taxanos*
- Bevacizumab†
- Al menos una quimioterapia basada en platino (p. ej., cisplatino o carboplatino)
- Inhibidor de PARP (por ejemplo, olaparib o niraparib)‡

*El 99.5% de las pacientes habían recibido anteriormente quimioterapia con taxanos.
†Todas las pacientes habían recibido bevacizumab anteriormente.
‡El 61% de las pacientes habían recibido anteriormente quimioterapia con inhibidores de PARP.

PARP significa poli (ADP-ribosa) polimerasa.

### Información importante de seguridad (continuación)

#### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LIFYORLI? (continuación)

**LIFYORLI puede causar efectos secundarios graves, tales como los siguientes:**

- **Reducción de los efectos de la hormona cortisol (insuficiencia suprarrenal).** LIFYORLI reduce el efecto de una hormona suprarrenal llamada "cortisol", lo que puede poner en riesgo la vida y requerir hospitalización. Esto puede ocurrir en cualquier momento durante el tratamiento. El riesgo de presentar insuficiencia suprarrenal aumenta cuando el cuerpo está bajo estrés, como cuando las personas se enferman, tienen una infección o se someten a una cirugía. Infórmele de inmediato al profesional de la salud si presenta los siguientes síntomas durante el tratamiento con LIFYORLI:
  - Sensación de mareo o aturdimiento
  - Presión arterial baja (hipotensión)
  - Niveles bajos de azúcar en sangre (hipoglucemia)
  - Empeoramiento de la debilidad o el cansancio
  - Empeoramiento de los vómitos o las náuseas
  - Empeoramiento de la pérdida de apetito o la pérdida de peso


**Consulte la información importante de seguridad adicional en la página 15 y los Datos importantes sobre LIFYORLI.**

## En comparación con el tratamiento con nab-paclitaxel solo, se demostró que la combinación de LIFYORLI con nab-paclitaxel:

Lifyorli™ (relacorilant) 100 mg, 25 mg capsules

### Ayuda a las mujeres a vivir más tiempo

**↓35%** menos de riesgo de muerte

### Reduce el riesgo de que el cáncer empeore

**↓30%** menos riesgo de que el cáncer empeore*

*La progresión se definió como el empeoramiento del cáncer, según lo mostrado en estudios por imágenes, o el fallecimiento de la paciente por cualquier causa, lo que ocurriera primero.




### Pacientes sobrevivientes luego de un año de tratamiento

**De las 188 pacientes que recibieron LIFYORLI en combinación con nab-paclitaxel, el 60% sobrevivió** luego de un año de tratamiento, en comparación con el 50% de las 193 pacientes que recibieron únicamente nab-paclitaxel.




### Pacientes que no presentaron signos de progresión del cáncer al año del tratamiento

**De las 188 pacientes que recibieron LIFYORLI en combinación con nab-paclitaxel, el cáncer no avanzó en el 25%** luego de un año de tratamiento, en comparación con el 13% de las 193 pacientes que recibieron únicamente nab-paclitaxel.

 **Consulte la información importante de seguridad en la página 15 y los Datos importantes sobre LIFYORLI.**

# Posibles efectos secundarios de LIFYORLI combinado con nab-paclitaxel

Lifyorli™ (relacorilant) 100 mg, 25 mg capsules

La combinación de LIFYORLI con nab-paclitaxel presentó un perfil de seguridad similar al ya establecido para nab-paclitaxel.

## El uso de LIFYORLI puede causar efectos secundarios graves, tales como los siguientes:

Recuentos bajos de glóbulos blancos (neutropenia) e infecciones graves, reducción de los efectos de la hormona cortisol (insuficiencia suprarrenal), empeoramiento de las afecciones tratadas con glucocorticoides y daño a los bebés en gestación.



No tome LIFYORLI si está tomando un medicamento esteroideo por vía oral o lo recibe mediante inyección (glucocorticoide sistémico) con fines de salvar la vida. LIFYORLI puede disminuir la eficacia de los medicamentos esteroideos y los esteroides pueden disminuir la eficacia de LIFYORLI. Si usa esteroides para otra afección, los síntomas pueden empeorar. Informe a su médico si nota algún cambio en sus síntomas mientras toma LIFYORLI.

## Entre los efectos secundarios más frecuentes de LIFYORLI combinado con nab-paclitaxel, se presentaron los siguientes:

- Disminución de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas
- Cansancio
- Náuseas
- Diarrea
- Sarpullido
- Disminución del apetito

Estos no son los únicos posibles efectos secundarios de LIFYORLI. Llame a su médico para recibir orientación sobre los posibles efectos secundarios.

## El 9% de las pacientes suspendió el tratamiento de forma permanente debido a los efectos secundarios. La mayoría de los efectos secundarios pudieron controlarse.


**Consulte la Información importante de seguridad en la página 15 y los Datos importantes sobre LIFYORLI.**




7 La persona que aparece no es una paciente real.

# Cómo tomar LIFYORLI

Lifyorli™ (relacorilant) 100 mg, 25 mg capsules

Se deben tomar **tres cápsulas blandas de LIFYORLI una vez al día** el día anterior a la infusión, el día de la infusión y el día después de cada infusión de nab-paclitaxel. Puede continuar con este programa de tratamiento mientras usted y su médico consideren que es lo más adecuado para usted.

Recibirá una infusión intravenosa (i.v.) de nab-paclitaxel una vez por semana, que dura aproximadamente 30 minutos. El ciclo de LIFYORLI junto con nab-paclitaxel se administra durante **tres semanas consecutivas, seguidas de una semana de descanso**.

**Si la fecha de infusión cambia, deje de tomar LIFYORLI hasta hablar con su equipo de atención médica. Ellos le indicarán exactamente cuándo reiniciar las dosis y si es necesario reemplazar alguna.**

## PROGRAMA DE TRATAMIENTO

### DÍA ANTERIOR

**LIFYORLI** 150 mg/día
3 cápsulas blandas




100 mg 25 mg 25 mg

### DÍA DE LA INFUSIÓN

**LIFYORLI** 150 mg/día
3 cápsulas blandas




100 mg 25 mg 25 mg

\+

**nab-paclitaxel**
80 mg/m² i.v.



### DÍA DESPUÉS

**LIFYORLI** 150 mg/día
3 cápsulas blandas




100 mg 25 mg 25 mg

Las cápsulas que se muestran representan su tamaño real.

**UN CICLO =** 3 semanas de tratamiento + 1 semana de descanso

Es fundamental tomar LIFYORLI exactamente como se lo indique su profesional de la salud.


**Consulte la Información importante de seguridad en la página 15 y los Datos importantes sobre LIFYORLI.**

# LIFYORLI se toma en casa

Tómelo en casa con alimentos.

Trague las cápsulas enteras. No las triture, mastique, disuelva ni abra.

Procure tomarlas a la misma hora todos los días, de preferencia por la mañana.

Si vomita después de tomar LIFYORLI, no tome una dosis adicional.

**¿Qué debe hacer si olvida tomar alguna dosis?**

**Si han pasado menos de 12 horas,** tómela tan pronto como lo recuerde.

**Si han pasado 12 horas o más,** tome la siguiente dosis a la hora habitual.




LIFYORLI viene en blísteres.
Cada blíster contiene tres dosis de LIFYORLI.

**HAGA CLIC AQUÍ** para ver el video sobre cómo tomar LIFYORLI.

## Información importante de seguridad (continuación)

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LIFYORLI? (continuación)

**LIFYORLI puede causar efectos secundarios graves, tales como los siguientes:**


- **Empeoramiento de las afecciones tratadas con glucocorticoides.** El tratamiento con LIFYORLI en personas que también usan glucocorticoides para tratar otras afecciones puede empeorar sus síntomas. LIFYORLI disminuye la eficacia de los glucocorticoides y el uso de estos últimos disminuye la eficacia de LIFYORLI. Si usa un glucocorticoide durante el tratamiento con LIFYORLI, infórmele al profesional de la salud si los síntomas de su enfermedad empeoran.


**Consulte la Información importante de seguridad adicional en la página 15 y los Datos importantes sobre LIFYORLI.**

# Cómo funciona LIFYORLI

Lifyorli™ (relacorilant) 100 mg, 25 mg capsules

LIFYORLI está diseñado para mejorar la eficacia de la quimioterapia. **Al inhibir la actividad del cortisol en las células cancerosas e inmunitarias**, aumenta la eficacia del nab-paclitaxel, un medicamento de quimioterapia, y puede activar indirectamente el sistema inmunitario. Esto ayuda al sistema inmunitario a combatir el cáncer.




## El cortisol puede reducir la eficacia de la quimioterapia

El cortisol se enlaza con el receptor glucocorticoide y lo activa. Con esta interacción se envían señales que reducen la eficacia de ciertos medicamentos de quimioterapia, como nab-paclitaxel, en las células cancerosas. Estas señales también reducen la respuesta natural del sistema inmunitario.

## LIFYORLI limita la acción del cortisol

LIFYORLI se enlaza con el receptor glucocorticoide y reduce la acción del cortisol.

**HAGA CLIC AQUÍ** para ver cómo funciona LIFYORLI en el cuerpo.

## La acción limitada del cortisol potencia la sensibilidad a la quimioterapia

LIFYORLI ayuda a aumentar la eficacia de la quimioterapia para destruir las células cancerosas y puede ayudar a que el sistema inmunitario sea más activo.

 **Consulte la Información importante de seguridad en la página 15 y los Datos importantes sobre LIFYORLI.**




11 Las personas que aparecen no son pacientes reales.

# Un apoyo que permanece con usted

## LIFYORLI Support™ puede ayudarle a dar el primer paso

Estamos aquí para acompañarla durante todo el tratamiento. Nuestro equipo está formado por personas como:

**Administradores de casos,** que pueden ayudarle a comprender la cobertura de su seguro y estimar sus posibles costos de bolsillo para recibir LIFYORLI

**Los educadores de enfermería de LIFYORLI Support** pueden responder las preguntas que tenga sobre LIFYORLI y hablar con usted sobre qué esperar del tratamiento.*



La persona que aparece no es una paciente real.

*Los educadores de enfermería de LIFYORLI Support no pueden brindar asesoramiento médico ni clínico; para ello, consulte a su médico, enfermero/a o farmacéutico.

# ¿Cómo puede LIFYORLI Support ayudarle a pagar su medicamento?

Lifyorli SUPPORT™



## Tarjeta de ahorro LIFYORLI

Si tiene seguro médico comercial (también conocido como seguro privado), podría calificar para **pagar desde $0** al mes por LIFYORLI.*

**HAGA CLIC AQUÍ** para confirmar su elegibilidad e inscribirse.



## Más opciones según su tipo de seguro

Si tiene seguro gubernamental, no tiene seguro o su cobertura es limitada, LIFYORLI Support puede ayudarle a encontrar otras opciones de asistencia financiera.

**HAGA CLIC AQUÍ** para obtener más información.

*Hasta los límites anuales del programa. Sujeto a los requisitos de elegibilidad y a los términos y condiciones del programa. Para conocer todos los términos y condiciones, comuníquese con LIFYORLI Support.

**Obtenga más información sobre cómo LIFYORLI Support puede ayudarle.** Llámenos al 1-85-LIFYORLI **(1-855-439-6754)**, de lunes a viernes, de 8 A. M. a 8 P. M., hora del Este (ET), o visite **LIFYORLI.com/support**.

# Términos útiles

Lifyorli™ (relacorilant) 100 mg, 25 mg capsules

Durante su tratamiento, es posible que escuche palabras que no le resulten familiares y que no siempre sean fáciles de entender. En esta sección de términos útiles le ofrecemos explicaciones sencillas a las que puede recurrir cada vez que lo necesite.

- **Resistencia a la quimioterapia:** situación en la que el cáncer reaparece o deja de responder al tratamiento con quimioterapia.
- **Cortisol:** hormona natural del cuerpo que ayuda a regular el metabolismo, controlar el estrés y cumplir otras funciones importantes en las células.
- **Receptor de glucocorticoides:** proteína del cuerpo a la que el cortisol puede enlazarse y, en algunos casos, hacer que la quimioterapia sea menos eficaz.
- **Nab-paclitaxel:** fármaco de quimioterapia que se utiliza para tratar varios tipos de cáncer.
- **Supervivencia global (SG):** tiempo que las pacientes permanecen con vida después de comenzar el tratamiento. Es una medida que suele utilizarse en estudios clínicos para evaluar qué tan eficaz es un tratamiento.
- **Quimioterapia basada en platino:** tratamiento común para el cáncer de ovario en el que se utilizan medicamentos como carboplatino o cisplatino para dañar las células cancerosas y detener su crecimiento.
- **Cáncer de ovario resistente al platino:** cáncer que deja de responder o reaparece dentro de los seis meses posteriores a la quimioterapia basada en platino.
- **Progresión:** empeoramiento o diseminación del cáncer.
- **Supervivencia libre de progresión (SLP):** período durante el cual el cáncer no empeora. Es otra medida que se utiliza en estudios clínicos para evaluar la eficacia de un tratamiento nuevo.
- **Recurrencia:** reaparición del cáncer después del tratamiento.

**HAGA CLIC AQUÍ** para encontrar respuestas a preguntas frecuentes sobre el cáncer de ovario resistente al platino y LIFYORLI.

## Información importante de seguridad

### ¿Quiénes no deben tomar LIFYORLI?

**No tome LIFYORLI si** está tomando un medicamento esteroideo por vía oral o lo recibe mediante inyección (glucocorticoide sistémico) con fines de salvar la vida. LIFYORLI puede disminuir la eficacia de los glucocorticoides.

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LIFYORLI?

**LIFYORLI puede causar efectos secundarios graves, tales como los siguientes:**

- **Recuento bajo de glóbulos blancos (neutropenia) e infecciones graves.** LIFYORLI combinado con nab-paclitaxel puede disminuir los recuentos de glóbulos blancos, lo que puede producir fiebre e infecciones graves, y causar la muerte. El profesional de la salud controlará sus recuentos de glóbulos antes de cada administración semanal de LIFYORLI combinado con nab-paclitaxel y cuando sea necesario. Informe de inmediato a este profesional si presenta fiebre, escalofríos, debilidad, confusión mental u otros signos o síntomas de una infección.
- **Reducción de los efectos de la hormona cortisol (insuficiencia suprarrenal).** LIFYORLI reduce el efecto de una hormona suprarrenal llamada "cortisol", lo que puede poner en riesgo la vida y requerir hospitalización. Esto puede ocurrir en cualquier momento durante el tratamiento. El riesgo de presentar insuficiencia suprarrenal aumenta cuando el cuerpo está bajo estrés, como cuando las personas se enferman, tienen una infección o se someten a una cirugía. Infórmele de inmediato al profesional de la salud si presenta los siguientes síntomas durante el tratamiento con LIFYORLI:
  - Sensación de mareo o aturdimiento
  - Presión arterial baja (hipotensión)
  - Niveles bajos de azúcar en sangre (hipoglucemia)
  - Empeoramiento de la debilidad o el cansancio
  - Empeoramiento de las náuseas o los vómitos
  - Empeoramiento de la pérdida de apetito o la pérdida de peso
- **Empeoramiento de las afecciones tratadas con glucocorticoides.** El tratamiento con LIFYORLI en personas que también usan glucocorticoides para tratar otras afecciones puede empeorar sus síntomas. LIFYORLI disminuye la eficacia de los glucocorticoides y el uso de estos últimos disminuye la eficacia de LIFYORLI. Si usa un glucocorticoide durante el tratamiento con LIFYORLI, infórmele al profesional de la salud si los síntomas de su enfermedad empeoran.

### Entre los efectos secundarios más frecuentes de LIFYORLI combinado con nab-paclitaxel, se encuentran los siguientes:

- Disminución de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas
- Cansancio
- Náuseas
- Diarrea
- Sarpullido
- Disminución del apetito

El profesional de la salud puede cambiar su dosis de LIFYORLI, retrasar el tratamiento o suspender por completo el tratamiento con LIFYORLI si tiene determinados efectos secundarios. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de LIFYORLI. Llame a su médico para recibir orientación sobre los posibles efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios que presente a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) al 1-800-FDA-1088.

### Antes de tomar LIFYORLI, informe a su profesional de la salud sobre todas sus afecciones médicas, incluso en los siguientes casos:

- Si tiene programada una cirugía o tuvo una cirugía en los últimos 30 días.
- Si tiene problemas hepáticos.
- Si está embarazada o planea quedar embarazada. LIFYORLI puede dañar al bebé en gestación.

  **Si es una mujer que puede quedar embarazada:**
  - Su profesional de la salud deberá realizarle una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento con LIFYORLI.
  - Use un anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con LIFYORLI y durante una semana después de la última dosis. Hable con su profesional de la salud sobre los métodos anticonceptivos adecuados durante el tratamiento.
  - Infórmele de inmediato si queda embarazada o cree que podría estarlo durante el tratamiento con LIFYORLI.

  **Si es un hombre que tiene una pareja de sexo femenino que puede quedar embarazada:**
  - Use un anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con LIFYORLI y durante una semana después de la última dosis.
- Si está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si LIFYORLI pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento con LIFYORLI ni durante la semana posterior a la última dosis.

**Informe a su profesional de la salud sobre todos los medicamentos que usa**, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Tomar LIFYORLI junto con otros medicamentos específicos puede afectar la eficacia de LIFYORLI o de los otros medicamentos y causar efectos secundarios.

**En particular, informe a su profesional de la salud si usa medicamentos esteroideos llamados "glucocorticoides".** Consulte con el profesional de la salud si no sabe con seguridad si está usando un glucocorticoide.

**Consulte los Datos importantes sobre LIFYORLI.**

Lifyorli™
(relacorilant) 100 mg, 25 mg capsules

# Dé el siguiente paso con LIFYORLI

LIFYORLI, administrado junto con nab-paclitaxel, es un medicamento para mujeres adultas con cáncer de ovario resistente al platino. Esta combinación ofrece una opción para las mujeres con casos de cáncer que no han respondido o han dejado de responder al tratamiento con quimioterapia basada en platino, y que han recibido entre 1 y 3 tratamientos sistémicos previos, de los cuales al menos uno ha incluido bevacizumab. **Además del tratamiento, tenemos recursos y apoyo disponibles para acompañarla durante su proceso, como los siguientes:**



Información sobre LIFYORLI y los resultados de estudios clínicos



Herramientas y recursos educativos



Ayuda para comprender la cobertura del seguro y las opciones de ahorro

**VISITE LIFYORLI.com** para obtener más información

**Información importante de seguridad**

**¿Quiénes no deben tomar LIFYORLI?**

**No tome LIFYORLI si** está tomando un medicamento esteroideo por vía oral o lo recibe mediante inyección (glucocorticoide sistémico) con fines de salvar la vida. LIFYORLI puede disminuir la eficacia de los glucocorticoides.

**Consulte la información importante de seguridad adicional en la página 15 y los Datos importantes sobre LIFYORLI.**

Lifyorli™ (relacorilant) 100 mg, 25 mg capsules

Corcept THERAPEUTICS

LIFYORLI, LIFYORLI Support y el logotipo de LIFYORLI son marcas comerciales de Corcept. Corcept y el logotipo de Corcept son marcas registradas.
© 2026 Corcept. US-REL-26-0130 04-26