



Para las mujeres que
enfrentan cáncer de ovario
resistente al platino:

Una guía práctica para tomar LIFYORLI



¿Qué es LIFYORLI?

LIFYORLI es un medicamento recetado que se usa junto con un medicamento de quimioterapia llamado nab-paclitaxel para tratar a adultos con cáncer de ovario, trompas de Falopio o peritoneal primario que cumplan con lo siguiente:

- No han respondido o han dejado de responder al tratamiento con quimioterapia basada en platino.
 - Han recibido entre 1 y 3 tratamientos sistémicos previos, de los cuales al menos uno ha incluido bevacizumab.
- Se desconoce la seguridad y la eficacia de LIFYORLI en menores de edad.

Consulte la **Información importante de seguridad de la página 11** y los **Datos importantes sobre LIFYORLI**.



Las personas que aparecen no son pacientes reales.



¿Podría LIFYORLI formar parte de su historia?

LIFYORLI junto con nab-paclitaxel (un medicamento de quimioterapia) ofrece una opción de tratamiento para mujeres con cáncer de ovario resistente al platino. **Su profesional de la salud puede decidir junto con usted si esta combinación es la adecuada para usted.**

Encuentre información importante sobre los siguientes temas:

Cómo tomar LIFYORLI

Posibles efectos secundarios de LIFYORLI combinado con nab-paclitaxel

Dónde encontrar recursos y apoyo

Consulte la Información importante de seguridad de la página 11 y los Datos importantes sobre LIFYORLI.

¿Qué es LIFYORLI y para quién es pensado?

LIFYORLI es un medicamento oral que se toma en forma de tres cápsulas blandas una vez al día: el día antes de la infusión, el día de la infusión y el día después de cada infusión de nab-paclitaxel. Esta combinación se utiliza para tratar a mujeres con cáncer de ovario que no han respondido o ya no responden al tratamiento con quimioterapia basada en platino, y que han recibido entre 1 y 3 tratamientos sistémicos previos, de los cuales al menos uno incluyó bevacizumab.



100 mg

Cápsula blanda



25 mg

Cápsula blanda



25 mg

Cápsula blanda

Las cápsulas que se muestran representan su tamaño real.

Tome las **tres cápsulas blandas** junto con algún alimento una vez al día, preferentemente por la mañana.

El envase que se muestra contiene nueve dosis de LIFYORLI y cuenta con un espacio en el reverso para anotar recordatorios sobre los días de tratamiento.

HAGA CLIC AQUÍ para obtener más información sobre cómo actúa LIFYORLI en el organismo.

Información importante de seguridad

¿Quiénes no deben tomar LIFYORLI?

No tome LIFYORLI si está tomando medicamentos esteroides por vía oral o los recibe mediante inyección (glucocorticoides sistémicos) con el fin de salvarle la vida. LIFYORLI puede reducir la eficacia de los medicamentos glucocorticoides.

Consulte la **Información importante de seguridad de la página 11** adicional y los **Datos importantes** sobre LIFYORLI.

 **Lifyorli™**
(relacorilant) 100 mg, 25 mg capsules

¿Cómo debo tomar LIFYORLI?

Se deben tomar **tres cápsulas blandas de LIFYORLI una vez al día** el **día anterior a la infusión**, el **día de la infusión** y el **día después de cada infusión de nab-paclitaxel**. Es fundamental tomar LIFYORLI tal como se lo indique su profesional de la salud.

PROGRAMA DE TRATAMIENTO

DÍA ANTERIOR

LIFYORLI 150 mg/día
3 cápsulas blandas



DÍA DE LA INFUSIÓN

LIFYORLI 150 mg/día
3 cápsulas blandas



+

nab-paclitaxel
80 mg/m² i.v.



DÍA DESPUÉS

LIFYORLI 150 mg/día
3 cápsulas blandas



Las cápsulas que se muestran no están en tamaño real. i.v.: intravenoso

Información importante de seguridad (continuación)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LIFYORLI?

LIFYORLI puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Recuento bajo de glóbulos blancos (neutropenia) e infecciones graves.** LIFYORLI, en combinación con nab-paclitaxel, puede causar un recuento bajo de glóbulos blancos, lo que puede provocar fiebre e infecciones graves e incluso causar la muerte. El profesional de la salud controlará su recuento de glóbulos antes de cada tratamiento semanal con LIFYORLI en combinación con nab-paclitaxel, y según sea necesario. Informe al profesional de la salud de inmediato si presenta fiebre, escalofríos, debilidad, confusión u otros signos o síntomas de una infección.

Consulte la [Información importante de seguridad de la página 11](#) adicional y los [Datos importantes sobre LIFYORLI](#).


Ciclo de tratamiento de LIFYORLI en combinación con nab-paclitaxel

El período de tratamiento de LIFYORLI junto con nab-paclitaxel dura **tres semanas, seguidas de una semana de descanso**.

Este período se considera un ciclo y se repite cada mes según la necesidad. Puede seguir con este cronograma de tratamiento mientras usted y el médico consideren que es lo más adecuado para usted.



Durante el período de tratamiento, recibirá una **infusión semanal de nab-paclitaxel que dura aproximadamente 30 minutos**.



¿Qué es el nab-paclitaxel?

El nab-paclitaxel es un tipo de quimioterapia que se usa junto con LIFYORLI para tratar a mujeres con cáncer de ovario resistente al platino.

Consulte la [Información importante de seguridad de la página 11](#) y los [Datos importantes sobre LIFYORLI](#).



LIFYORLI viene en blísters. Cada blíster contiene tres dosis de LIFYORLI.

HAGA CLIC AQUÍ para ver el video
Cómo tomar LIFYORLI.

Consejos útiles para tomar LIFYORLI




Tómelo en su hogar junto con los alimentos.



Procure tomarlo a la misma hora todos los días, de preferencia por la mañana.



Trague las cápsulas enteras. No las triture, mastique, disuelva ni parta.



Use su planificador personal o configure recordatorios en su teléfono para seguir su esquema de dosis de LIFYORLI.

Si vomita después de tomar LIFYORLI, no tome una dosis adicional.

¿Qué debo hacer si olvido tomar alguna dosis?

A veces, las cosas no salen como planeamos. **Si se le olvida tomar LIFYORLI a la hora habitual, siga estas sencillas indicaciones:**



Si han pasado menos de 12 horas,
tome la dosis tan pronto como lo recuerde.



Si han pasado 12 horas o más,
tome la siguiente dosis a la hora habitual.

Consulte la [Información importante de seguridad de la página 11](#)
y los [Datos importantes sobre LIFYORLI](#).

 **Lifyorli™**
(relacorilant) 100 mg, 25 mg
capsules

¿Qué debo hacer si cambia la fecha de mi infusión de nab-paclitaxel?



Deje de tomar LIFYORLI de inmediato. Reanude sus dosis el día antes de su próxima infusión. Tome LIFYORLI una vez el **día antes de la infusión**, el **día de la infusión**, y el **día después de cada infusión de nab-paclitaxel**.

Consulte siempre a su profesional de la salud si le han cambiado las infusiones programadas para adaptar el calendario de LIFYORLI. El profesional de la salud también puede responderle cualquier pregunta o inquietud.

Información importante de seguridad (continuación)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LIFYORLI? (continuación)

LIFYORLI puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Disminución de los efectos de la hormona cortisol (insuficiencia suprarrenal).** LIFYORLI reduce el efecto de una hormona suprarrenal llamada cortisol, lo cual puede poner en peligro la vida y requerir hospitalización. Esto puede ocurrir en cualquier momento durante el tratamiento. El riesgo de insuficiencia suprarrenal aumenta cuando el cuerpo se encuentra bajo estrés, por ejemplo, cuando usted está enferma, presenta una infección o se somete a una cirugía. Informe al profesional de la salud de inmediato si presenta los siguientes síntomas durante el tratamiento con LIFYORLI:
 - Sensación de mareo o aturdimiento
 - Presión arterial baja (hipotensión)
 - Niveles bajos de glucosa en sangre (hipoglucemia)
 - Empeoramiento del cansancio o la debilidad
 - Empeoramiento de las náuseas o los vómitos
 - Empeoramiento de la pérdida de apetito o de peso

Consulte la **Información importante de seguridad de la página 11** adicional y los **Datos importantes** sobre LIFYORLI.

¿Cómo puedo prepararme para recibir el tratamiento con LIFYORLI?

Es fundamental que comparta todos sus antecedentes médicos con su equipo de atención médica para que puedan guiarla con su plan de tratamiento.

Informe al profesional de la salud si usa medicamentos esteroides llamados glucocorticoides



No tome LIFYORLI si está tomando medicamentos esteroides por vía oral o los recibe mediante inyección (glucocorticoides sistémicos) con el fin de salvarle la vida. LIFYORLI puede hacer que los medicamentos esteroides sean menos eficaces, y los esteroides pueden restarle eficacia a LIFYORLI. Si usa esteroides para otra afección, sus síntomas podrían empeorar. Si no está seguro de si usa esteroides, consulte al profesional de la salud.

Comparta una lista actualizada de los medicamentos que toma



Informe al profesional de la salud sobre todos los medicamentos que usa, **incluidos los medicamentos recetados y los de venta libre, las vitaminas y los suplementos herbales**. LIFYORLI puede afectar la manera en que sus otros medicamentos funcionan, y otros medicamentos pueden afectar la manera en que funciona LIFYORLI.

Esté preparada para una extracción de sangre



Su profesional de la salud ordenará análisis de sangre para **controlar su recuento de glóbulos blancos y otros parámetros de salud**. Comuníquese con su profesional si tiene preguntas sobre el tratamiento.

Tome el control de la conversación en su próxima cita.

La Guía de conversación con el equipo de atención le ayudará a asegurarse de que reciba respuesta a todas sus inquietudes y preguntas.

Consulte la **Información importante de seguridad de la página 11** y los **Datos importantes** sobre LIFYORLI.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LIFYORLI en combinación con nab-paclitaxel?

La seguridad de LIFYORLI se evaluó en un estudio clínico global con 381 mujeres que padecían cáncer de ovario resistente al platino. Entre las pacientes del estudio, el 9% interrumpió el tratamiento permanentemente debido a los efectos secundarios.

El uso de LIFYORLI puede causar efectos secundarios graves incluidos los siguientes:

Recuento bajo de glóbulos blancos (neutropenia) e infecciones graves, disminución de los efectos de la hormona cortisol (insuficiencia suprarrenal), empeoramiento de las afecciones tratadas con glucocorticoides y efectos nocivos para el bebé en gestación.

Entre los efectos secundarios más frecuentes de LIFYORLI en combinación con nab-paclitaxel se incluyen los siguientes:

- Disminución del recuento de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas
- Náuseas
- Disminución del apetito
- Cansancio
- Diarrea
- Sarpullido

Estas no son todas las posibles reacciones adversas de LIFYORLI. Llame a su médico para recibir orientación sobre los posibles efectos secundarios.

LIFYORLI puede dañar al bebé en gestación. Por eso, es importante que tome las siguientes precauciones:

- Hágase una **prueba de embarazo** antes de iniciar LIFYORLI.
- Utilice **anticonceptivos** durante el tratamiento y al menos una semana después de la última dosis.
- **Evite amamantar** durante el tratamiento y al menos una semana después de la última dosis.



Consulte a su profesional de la salud sobre métodos anticonceptivos eficaces. **Llame a su equipo de atención médica de inmediato si queda embarazada o piensa que podría estarlo.**

Consulte la [Información importante de seguridad de la página 11](#) y los [Datos importantes sobre LIFYORLI](#).

¿Cómo debo almacenar LIFYORLI?



Guarde LIFYORLI a **temperatura ambiente** entre **68 °F y 77 °F** (20 °C y 25 °C).



Mantenga LIFYORLI y todos los medicamentos **fuera del alcance de los niños.**

Use su planificador personal para organizar su tratamiento



Anote las fechas de sus próximas infusiones de nab-paclitaxel y el cronograma de LIFYORLI.



Lleve un seguimiento del progreso de su tratamiento y de sus logros.



HAGA CLIC AQUÍ
para descargar páginas adicionales para su planificador.

Su planificador personal está incluido en su Kit de bienvenida de LIFYORLI.
Si aún no lo ha recibido, consulte a su equipo de atención médica.

Información importante de seguridad

¿Quiénes no deben tomar LIFYORLI?

No tome LIFYORLI si está tomando medicamentos esteroideos por vía oral o los recibe mediante inyección (glucocorticoides sistémicos) con el fin de salvarle la vida. LIFYORLI puede reducir la eficacia de los medicamentos glucocorticoides.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LIFYORLI?

LIFYORLI puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Recuento bajo de glóbulos blancos (neutropenia) e infecciones graves.** LIFYORLI, en combinación con nab-paclitaxel, puede causar un recuento bajo de glóbulos blancos, lo que puede provocar fiebre e infecciones graves e incluso causar la muerte. El profesional de la salud controlará su recuento de glóbulos antes de cada tratamiento semanal con LIFYORLI en combinación con nab-paclitaxel, y según sea necesario. Informe al profesional de la salud de inmediato si presenta fiebre, escalofríos, debilidad, confusión u otros signos o síntomas de una infección.

- **Disminución de los efectos de la hormona cortisol (insuficiencia suprarrenal).** LIFYORLI reduce el efecto de una hormona suprarrenal llamada cortisol, lo cual puede poner en peligro la vida y requerir hospitalización. Esto puede ocurrir en cualquier momento durante el tratamiento. El riesgo de insuficiencia suprarrenal aumenta cuando el cuerpo se encuentra bajo estrés, por ejemplo, cuando usted está enferma, presenta una infección o se somete a una cirugía. Informe al profesional de la salud de inmediato si presenta los siguientes síntomas durante el tratamiento con LIFYORLI:

- Sensación de mareo o aturdimiento
- Presión arterial baja (hipotensión)
- Niveles bajos de glucosa en sangre (hipoglucemia)
- Empeoramiento del cansancio o la debilidad
- Empeoramiento de las náuseas o los vómitos
- Empeoramiento de la pérdida de apetito o de peso

- **Empeoramiento de afecciones tratadas con glucocorticoides.** El tratamiento con LIFYORLI en personas que también usan glucocorticoides para otras afecciones puede agravar los síntomas de estas afecciones. LIFYORLI reduce la eficacia de los glucocorticoides, y el uso de los glucocorticoides le resta eficacia a LIFYORLI. Si usa algún medicamento glucocorticoide durante el tratamiento con LIFYORLI, informe al profesional de la salud si los síntomas de su otra afección empeoran.

Entre los efectos secundarios más frecuentes de LIFYORLI en combinación con nab-paclitaxel se encuentran los siguientes:

- Disminución del recuento de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas
- Cansancio
- Náuseas
- Diarrea
- Sarpullido
- Disminución del apetito

El profesional de la salud podrá ajustar la dosis de LIFYORLI, retrasar el tratamiento o suspenderlo de forma definitiva si tiene determinados efectos secundarios. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de LIFYORLI. Llame a su médico para recibir orientación sobre los posibles efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios que tenga a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) al 1-800-FDA-1088.

Antes de tomar LIFYORLI, informe al profesional de la salud sobre todas sus afecciones médicas, incluso en los siguientes casos:

- Tiene previsto someterse a una cirugía o ha tenido una cirugía en los últimos 30 días.
- Tiene problemas hepáticos.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. LIFYORLI puede dañar al bebé en gestación.

Mujeres en edad fértil:

- El profesional de la salud deberá hacerle una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento con LIFYORLI.
- Use un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con LIFYORLI y durante la semana posterior a la última dosis. Hable con su profesional de la salud sobre los métodos anticonceptivos adecuados durante el tratamiento.
- Infórmele al profesional de la salud de inmediato si queda embarazada o cree que podría estarlo durante el tratamiento con LIFYORLI.

Hombres con parejas de sexo femenino en edad fértil:

- Use un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con LIFYORLI y durante la semana posterior a la última dosis.
- Está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si LIFYORLI pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento con LIFYORLI ni durante la semana posterior a la última dosis.

Informe al profesional de la salud sobre todos los medicamentos que usa, incluidos los medicamentos recetados y los de venta libre, las vitaminas y los suplementos herbales. El uso de LIFYORLI junto con otros medicamentos específicos puede interferir en la eficacia de cualquiera de ellos y aumentar el riesgo de tener efectos secundarios.

Asegúrese de informar al profesional de la salud, especialmente si usa medicamentos esteroideos llamados glucocorticoides. Pregúntele si no tiene la certeza de estar tomando algún glucocorticoide.

Consulte los **Datos importantes** sobre LIFYORLI.

 **Lifyorli™**
(relacorilant) 100 mg, 25 mg capsules



LIFYORLI Support™ está aquí para acompañarla durante todo el tratamiento

Podemos ayudarla a:



Entender su cobertura de seguro médico



Explorar opciones de ahorro



Obtener orientación personalizada y recursos

HAGA CLIC AQUÍ

para encontrar apoyo en cada etapa del tratamiento.

Llame a LIFYORLI Support al **1-85-LIFYORLI (1-855-439-6754)**, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del este (ET), o visite LIFYORLI.com/support.

Las personas que aparecen no son pacientes reales.

 **Lifyorli**TM
(relacorilant) 100 mg, 25 mg
capsules

 **Corcept**
THERAPEUTICS

LIFYORLI, LIFYORLI Support y el logotipo de LIFYORLI son marcas comerciales de Corcept. Corcept y el logotipo de Corcept son marcas registradas. © 2026 Corcept. US-REL-26-0131 04-26